

# PHARMiNDEX

## Krople przeciwjaskrowe

- trwałość po otwarciu,  
warunki przechowywania  
oraz zawartość subst. pomoc.

**30**  
— LAT —

PHARMINDEX

	Substancja czynna	Warunki przechowywania - nieotwarte opakowanie	Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu	Trwałość po pierwszym otwarciu	Chlorek benzalkoniowy	Fosforany	Inne subst. pomocnicze o znanym działaniu
<b>Akistan</b>	Latanoprost	lodówka (2°C-8°C); chronić przed światłem	poniżej 25° C	28 dni	✓	✓	
<b>Akistan Duo</b>	Timolol; Latanoprost	lodówka (2°C-8°C)	poniżej 25° C	28 dni	✓	✓	
<b>Alphagan</b>	Brimonidine tartrate	poniżej 25° C	poniżej 25° C	28 dni	✓		
<b>Azarga</b>	Timolol; Brinzolamide	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		
<b>Azopt</b>	Brinzolamide	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		
<b>Betoptic 0,5%</b>	Betaxolol	poniżej 25° C; chronić przed światłem	poniżej 25° C; chronić przed światłem	28 dni	✓		
<b>Betoptic S</b>	Betaxolol	Brak specjalnych zaleceń; chronić przed światłem	Brak specjalnych zaleceń; chronić przed światłem	28 dni	✓		
<b>Bimaroz Duo</b>	Timolol; Bimatoprost	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓	✓	
<b>Bimican</b>	Bimatoprost	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓	✓	
<b>Bimifree</b>	Bimatoprost	Brak specjalnych zaleceń	poniżej 25° C	90 dni		✓	
<b>Bimifree Combi</b>	Timolol; Bimatoprost	Brak specjalnych zaleceń	poniżej 25° C	90 dni		✓	
<b>Biprolast</b>	Brimonidine tartrate	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		
<b>Briglau Free</b>	Brimonidine tartrate	poniżej 30° C	poniżej 30° C	90 dni			
<b>Briglau PPH</b>	Brimonidine tartrate	poniżej 25° C	poniżej 25° C	28 dni	✓		
<b>Brinzolamide Genoptim</b>	Brinzolamide	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		
<b>Carteol LP</b>	Carteolol hydrochloride	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓	✓	
<b>Combigan</b>	Timolol; Brimonidine tartrate	poniżej 25° C; chronić przed światłem	poniżej 25° C; chronić przed światłem	28 dni	✓	✓	
<b>Cosopt®</b>	Timolol; Dorzolamide	poniżej 25° C; chronić przed światłem	poniżej 25° C; chronić przed światłem	28 dni	✓		
<b>Cusimolol</b>	Timolol	poniżej 25° C	poniżej 25° C	28 dni	✓	✓	
<b>Duokopt</b>	Timolol; Dorzolamide	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	2 miesiące			

	Substancja czynna	Warunki przechowywania - nieotwarte opakowanie	Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu	Trwałość po pierwszym otwarciu	Chlorek benzalkoniowy	Fosforany	Inne subst. pomocnicze o znanym działaniu
DuoTrav	Timolol; Travoprost	poniżej 30° C	poniżej 30° C	28 dni			glikol propylenowy; polioksyetylenowany olej rycynowy uwodorniony (makrogoliglicerolu hydroksystearynian)
Ganfort	Timolol; Bimatoprost	Brak specjalnych zaleceń	poniżej 25° C	28 dni	✓	✓	
Latacom	Timolol; Latanoprost	<b>lodówka</b> (2°C-8°C)	poniżej 25° C	28 dni	✓	✓	
Latalux	Latanoprost	<b>lodówka</b> (2°C-8°C); chronić przed światłem	poniżej 25° C	28 dni	✓	✓	
Latanoprost + Timolol Genoptim	Timolol; Latanoprost	<b>lodówka</b> (2°C-8°C); chronić przed światłem	poniżej 25° C; chronić przed światłem	28 dni	✓	✓	
Latanoprost Genoptim®	Latanoprost	<b>lodówka</b> (2°C-8°C); chronić przed światłem	poniżej 25° C	28 dni	✓	✓	
Lumigan	Bimatoprost	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		
Luxfen	Brimonidine tartrate	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		
Monoprost	Latanoprost	poniżej 25° C	poniżej 25° C	Po pierwszym otwarciu <b>saszetki: 10 dni;</b> Po pierwszym otwarciu <b>pojemnika</b> jednodawkowego: <b>zużyć natychmiast</b>			polioksyetylenowany olej rycynowy uwodorniony (makrogoliglicerolu hydroksystearynian)
Nodofree	Dorzolamide	poniżej 30° C	poniżej 25° C	90 dni			
Nodofree Combi	Timolol; Dorzolamide	poniżej 30° C	poniżej 25° C	90 dni			
Nodom	Dorzolamide	poniżej 25° C	poniżej 25° C	28 dni	✓		
Nodom Combi	Timolol; Dorzolamide	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		
Oftensin	Timolol	poniżej 25° C	poniżej 25° C	28 dni	✓	✓	
Oftidor	Dorzolamide	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	30 dni	✓		
Oftidorix	Timolol; Dorzolamide	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		

	Substancja czynna	Warunki przechowywania - nieotwarte opakowanie	Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu	Trwałość po pierwszym otwarciu	Chlorek benzalkoniowy	Fosforany	Inne subst. pomocnicze o znanym działaniu
Optibetol	Betaxolol	Brak specjalnych zaleceń; chronić przed światłem	Brak specjalnych zaleceń; chronić przed światłem	28 dni	✓		
Optilamid	Brinzolamide	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		
Pilocarpinum WZF	Pilocarpine hydrochloride	poniżej 25° C	poniżej 25° C	30 dni	✓		
Rozacom	Timolol; Dorzolamide	poniżej 25° C; chronić przed światłem	poniżej 25° C; chronić przed światłem	28 dni	✓		
Rozaduo	Timolol; Travoprost	poniżej 25° C; chronić przed światłem	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		polioksyetylenowany olej rycynowy uwodorniony (makroglicerolu hydroksystearnian)
Rozalin	Dorzolamide	poniżej 25° C	poniżej 25° C	28 dni	✓		
Rozaprost	Latanoprost	<b>lodówka</b> (2°C-8°C); chronić przed światłem	poniżej 25° C	28 dni	✓	✓	
Rozaprost Mono	Latanoprost	<b>lodówka</b> (2°C-8°C)	poniżej 25° C	Po pierwszym otwarciu saszetki: <b>7 dni</b> ; Po pierwszym otwarciu pojemnika jednodawkowego: zużyć <b>natychmiast</b>		✓	
Rozatrav	Travoprost	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		polioksyetylenowany olej rycynowy uwodorniony (makroglicerolu hydroksystearnian)
Simbrinza	Brimonidine tartrate; Brinzolamide	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		
Taflotan	Tafluprost	<b>lodówka</b> (2°C-8°C)	poniżej 25° C (po otwarciu torebki z pojemnikami jednodawkowym; przechowywać w oryginalnej torebce foliowej)	Po pierwszym otwarciu torebki: <b>28 dni</b> ; Po pierwszym otwarciu pojemnika jednodawkowego: zużyć <b>natychmiast</b>		✓	

	Substancja czynna	Warunki przechowywania - nieotwarte opakowanie	Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu	Trwałość po pierwszym otwarciu	Chlorek benzalkoniowy	Fosforany	Inne subst. pomocnicze o znanym działaniu
<b>Taflotan Multi</b>	Tafluprost	lodówka (2°C-8°C)	poniżej 25° C	3 miesiące		✓	
<b>Taptiqom</b>	Timolol; Tafluprost	lodówka (2°C-8°C)	poniżej 25° C; chronić przed światłem	28 dni		✓	
<b>Tilaprox</b>	Timolol; Latanoprost	lodówka (2°C-8°C)	poniżej 25° C	28 dni	✓	✓	
<b>Timo-Comod</b>	Timolol	poniżej 25° C	poniżej 25° C	84 dni		✓	
<b>Timoptic</b>	Timolol	poniżej 30° C	poniżej 30° C	28 dni	✓	✓	
<b>Travatan®</b>	Travoprost	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni			polikwaternium-1 (POLYQUAD); glikol propylenowy; polioksyetylenowany olej rycynowy uwodorniony (makrogoglicerolu hydroksystearynian)*
<b>Travoprost + Timolol Medical Valley</b>	Timolol; Travoprost	poniżej 25° C; chronić przed światłem	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		polioksyetylenowany olej rycynowy uwodorniony (makrogoglicerolu hydroksystearynian)
<b>Travoprost Genoptim</b>	Travoprost	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		polioksyetylenowany olej rycynowy uwodorniony (makrogoglicerolu hydroksystearynian)
<b>Travoprost+Timolol Genoptim</b>	Timolol; Travoprost	poniżej 25° C; chronić przed światłem	Brak specjalnych zaleceń	28 dni	✓		polioksyetylenowany olej rycynowy uwodorniony (makrogoglicerolu hydroksystearynian)
<b>Trusopt</b>	Dorzolamide	poniżej 25° C	poniżej 25° C	28 dni	✓		
<b>Vizibim</b>	Bimatoprost	Brak specjalnych zaleceń	Brak specjalnych zaleceń	28 dni		✓	
<b>Vizidor</b>	Dorzolamide	poniżej 30° C	poniżej 30° C	28 dni			

	Substancja czynna	Warunki przechowywania - nieotwarte opakowanie	Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu	Trwałość po pierwszym otwarciu	Chlorek benzalkoniowy	Fosforany	Inne subst. pomocnicze o znanym działaniu
<b>Vizidor Duo</b>	Timolol; Dorzolamide	poniżej 30° C	poniżej 30° C	28 dni			
<b>Vizilatan</b>	Latanoprost	poniżej 25° C	Brak specjalnych zaleceń	28 dni		✓	polioksyetylenowany olej rycynowy uwodorniony (makroglicerolu hydroksystearnian)
<b>Vizitrav</b>	Travoprost	poniżej 25° C	poniżej 25° C	28 dni			polioksyetylenowany olej rycynowy uwodorniony (makroglicerolu hydroksystearnian)
<b>Xalacom®</b>	Timolol; Latanoprost	<b>lodówka</b> (2°C-8°C); chronić przed światłem	poniżej 25° C; chronić przed światłem	28 dni	✓	✓	
<b>Xalatan®</b>	Latanoprost	poniżej 25° C; chronić przed światłem	poniżej 25° C; chronić przed światłem	28 dni	✓	✓	
<b>Xalofree</b>	Latanoprost	poniżej 25° C	poniżej 25° C	90 dni		✓	
<b>Xaloptic</b>	Latanoprost	<b>lodówka</b> (2°C-8°C); chronić przed światłem	poniżej 25° C	28 dni	✓	✓	
<b>Xaloptic Combi</b>	Timolol; Latanoprost	<b>lodówka</b> (2°C-8°C)	poniżej 25° C; chronić przed światłem	28 dni	✓	✓	
<b>Xaloptic Free</b>	Latanoprost	<b>lodówka</b> (2°C-8°C)	poniżej 25° C	Po pierwszym otwarciu <u>saszetki</u> : <b>7 dni</b> ; Po pierwszym otwarciu <u>pojemnika</u> jednodawkowego: zużyć <b>natychmiast</b>		✓	

PHARMiNDEX

# PHARMiNDEX

**PHARMINDEX Poland Sp. z o.o.**

ul. Olkuska 7

02-604 Warszawa

e-mail: [info@pharmindex.pl](mailto:info@pharmindex.pl)

[www.pharmindex.pl](http://www.pharmindex.pl)